

# کھنڈ Wheat

(پیداواری حکومت عملی)



DIRECTORATE INFORMATION  
AGRICULTURE EXTENSION SINDH

زرعی اطلاعات، زرعی توسعی

زراعت کا تو حکومتِ سندھ

2021-2022

ڪڪ سند جي ربیع جواهر فصل آهي. جيڪو آبادگارن جي پنهنجي خوراڪي ضرورتن جي پورائي سان گڏ سندن آمدنيءَ جوبه مکيءَ ذريعي آهي.

ڪڪ جي فصل مان عام طور تي آبادگار سراسري پيداوار ويه پنجوييه منظمي ايڪڙ کڻن ٿا. جيڪا پيداوار نهايت ئي گهت آهي. جڏهن ته سند جا ڪجهه آبادگار ڪڪ مان اسي پنجاسي منظمي ايڪڙ پٺن کشي رهيا آهن. جنهن جو مطلب هي آهي ته ڪڪ جي فصل ۾ پيداوار ڏيٺن جي صلاحيت گھڻي سٺي آهي. صرف غور ڪرڻ جي ضرورت آهي ته ڪھڙي طريقي سان ۽ ڪھڙين ڳالهين تي وڌيڪ ڏيان ڏيٺن سان سٺي پيداوار کشي سگهجي ٿي. ان سلسلني ۾ گذارش هيءَ آهي ته ڪڪ جي پوكيءَ لاءِ زمين جي چونڊ ۽ تياريءَ کان وٺي ٿريشر هڻهه تائين هر ڪم کي نهايت ڏيان سان ڪرڻ جي ضرورت آهي. ان لاءِ ماهرن جي پُڌايل تجويزن تي مڪمل طور تي عمل ڪرڻ سان ئي سٺي پيداوار کشي سگهجي ٿي.

### زمين جي چونڊ ۽ تياري:

ڪڪ لاءِ اهڙي زمين چونڊ ڪجي جيڪا زرخيز ۽ نامياتي مادي سان پرپور هجي. پر جيڪڏهن زمين ڪمزور هجي ته اُن زمين کي ڪڪ پوکڻ کان هڪ مهينو پهرين ڳريل سڙيل وٺڻ جي ڀاڻ جون 3 ٽركون ڏئي هرن سان ملائي ريج ڪجي. ٿي سگهي ته پتو ريج ڪجي ته جيئن ڀاڻ زمين ۾ چڱي ريت ڳري ملي وڃي. جنهن بعد زمين کي ٺوس ڪلتيوير جا ٻه ڏئي پوكيءَ لاءِ تيار ڪجي. نازئي پوك لاءِ ڪلتيوير پويان ڳاڏي پڏجي ته جيئن زمين ۾ سيءَ موجود رهي.

جيڪڏهن زمين هموار نه هجي ته پوءِ زمين کي ليزر مشين ذريعي سنوت ۾ آڻجي ته جيئن فصل کي هڪجيتروپاڻي ۽ ڀاڻ ملي سگهي.

## جنسون ۽ پوکي جي مند:

ڪٽڪ جي فصل جون نهايت ئي اعلي آڳاتيون، پاچاتيون ۽ سجي مند واريون جنسون موجود آهن، جيڪي مقرر وقت تي پوکي ڪرڻ سان تمام سٺي پيداوار ڏين ٿيون پر آنهن کي پنهنجي وقت کان آڳاتو يا پاچاتو ڪري پوکن سان ٻلي پيداوار نشي لهي ان ڪري هيٺ ڄاڻايل جنسن مان بهترین پيداوار ڪڻ لاءِ لازمي طور تي انهن کي سفارش ڪيل وقت تي ئي پوکن گهرجي:

پوکي جو وقت	علامه	سفارش ڪيل جنسو
پهرين نومبر کان 20 نومبر	ڏڪن سنڌ	بنڀظير-13، حمل-13 مومن-89، آبادگار-93، سرسبيز
7 نومبر کان 30 نومبر	اٽر سنڌ	
21 نومبر کان 15 دسمبر	ڏڪن سنڌ	تي جي-83، انمول-91 سرسبيز ۽ ڪرن-93
پهرين دسمبر کان 21 دسمبر	اٽر سنڌ	
پهرين نومبر کان 25 دسمبر	سجي سنڌ	تي دي-1، سڪريند-1، پٽائي ۽ مارئي-2000

## پوکن جا طريقا:

ڪٽڪ جي پوکي جا مروج تي طريقا آهن

1. ڇت کيڙ 2. ڪُريا گھڻبي 3. ناري پوک.

ڇت کيڙ سارين کان پوءِ واندي ٿيل زمين لاءِ مناسب طريقو آهي، جڏهن ته سارين جي واندي ٿيل زمين ۾ زир و تلیج ناريءَ ذريعي پڻ پوکي ڪري سگهجي ٿي، پڪين، سمر ۽ ڪلر وارين زمين ۾ ڪُريا گھڻبي پوک ڪجي، پر ڪُريا گھڻبيءَ واري پوک لاءِ هڪ ته جڏهن زمين پاڻي ڪڻي وڃي ته پوءِ ٻج گپ ۾ چتنجي ۽ ٻج کي چتن ڪان پهرين پاڻيءَ ۾ 8 کان 10 ڪلاڪ پسائلن گهرجي، ٻج کي پاڻيءَ ۾ پسائلن سان ٻج جو ڦوئهڙو وڌيڪ پلو ٿيندو، اهڙي طرح پلين زمين ۾ ڪٽڪ جي پوکي ناريءَ رستي ڪجي، ناري پوک ۾ گندگاهم جي ضابطي ۾ آساني ٿئي ٿي، ياط صحبي طريقي ڏجي ٿو، ٻج گهٽ استعمال ٿئي ٿو ۽ ڦوئهڙو

پلو ٿيڻ سان گڏ نازٽي پوک ٻين جي مقابللي ۾ وڌيڪ پيداوار ڏئي ٿي.

### ٻچ (ڪلوگرام في ايڪر):

جنسون	ناڙي: ذريعي	ڇت كير: ذريعي	ڪريا گهرڙي: ذريعي	كريين تي پوک
آڳاتي پوک	50	55	60	60
پاچاتي پوک	60	65	70	70

### پاڻن جي گهرج:

عام طور تي سند جون زمينون نائتروجن. فاسفورس ۽ پوتاش ۾ ڪمزور آهن. جڏهن ته عام آبادگار نائتروجن ۽ فاسفورس وارا ڀاڻ ڪڪ کي ڏئي ٿو پر پوتاش نتو ڏئي. نائتروجن ۽ فاسفورس ۾ به فاسفورس گهٽ ۽ نائتروجن وڌيڪ ڏئي وڃي ٿي جنهن جي ڪري گهربل پيداوار نشي ملي. ان ڪري آبادگارن کي صلاح ٿي ڏجي ته ڪڪ پوکڻ کان پهرين پنهنجي زمين جي متى ڪنهن ويجهي متى ۽ پاڻي جي چڪاس واري ليبارتريءَ مان ضرور چڪاس ڪرائين ۽ ليبارتريءَ جي ماهرن جي سفارشن مطابق ڀاڻ جو استعمال ڪن. جنهن سان ڀاڻ جو صحيح استعمال ٿيندو ۽ پيداوار پٽ سٺي لهندي. پر جي ڪڏهن ڪنهن اٽر سبب جي ڪري متى چڪاس ن ٿي سگهي ته پوءِ سٺي زمين ۾ هيندين ريت ڪڪ جي فصل کي ڀاڻ ڏيڻ گهرجي:

1. ٻوري ديو پي. اڌ ٻوري يوري ۽ هڪ ٻوري ايس او بيو في ايڪر ڏيڻ گهرجي.
2. ڪڪ جي تي ديو -1 جنس کي 2 ٻوريون ديو اي بيو ۽ 3 کان 4 ٻوريون يوري في ايڪر ڏجن.

### ڪڪ لاءِ مر حليوار پاڻي جي ورهاست

ڪل پاڻي	تن هفتنهن يا 21 ڏينهن کان پوءِ	ٻهريون پاڻي يا 42 ڏينهن کان پوءِ	ٻيون پاڻي يا 63 ڏينهن کان پوءِ	نون هفتنهن يا 84 ڏينهن کان پوءِ	چوٽون پاڻي يا 105 ڏينهن کان پوءِ	پنجون پاڻي يا 126 ڏينهن کان پوءِ	ڄمون پاڻي يا ارڙهن هفتنهن يا 126 ڏينهن کان پوءِ
6	نڪڻ وقت پن پاڙ	نڪڻ وقت پن پاڙ	سنگ نڪڻ وقت	پورا چڻ وقت	دائي ۾ ڪير تيڻ وقت	دائي ٻچن وقت	دائي ٻچن وقت
5	نڪڻ وقت پن پاڙ	نڪڻ وقت پن پاڙ	سنگ نڪڻ وقت	-	دائي ۾ ڪير تيڻ وقت	دائي ٻچن وقت	دائي ٻچن وقت

-	داتشي پر کير ٿيڻ وقت	-	سنگ نڪڻ وقت	پوري پڏڻ وقت	پن پاڙ نڪڻ وقت	4
-	داتشي پر کير ٿيڻ وقت	-	سنگ نڪڻ وقت	-	پن پاڙ نڪڻ وقت	3
-	-	-	-	پوري پڏڻ وقت	پن پاڙ نڪڻ وقت	2
-	-	-	-	پوري پڏڻ وقت	پن پاڙ نڪڻ وقت	1

### گندگاه:

سوڙهن پن وارن گاهن لاءِ تاپک هڪ سؤ گرام في ايڪڙ ۽ ويڪرن پن وارن گندگاه لاءِ بڪتل سپر 300 کان 400 ملي لتر في ايڪڙ ۽ سوڙهن ۽ ويڪرن گذيل گندگاهن لاءِ ايڦينتنى 600 کان 800 گرام في ايڪڙ ڏجي. سمورن زهرن کي 120 لتر في ايڪڙ جي حساب سان پاڻي ۾ ملائي ڦوارو ڪرڻ گهرجي. ڦواراري لاءِ مشين ۾ گندگاهه وارونو ڦال استعمال ڪجي.

### جيٽ ۽ بيماريون:

جيٽن ۽ بيمارين جو گھطو ڪري سند جي ڪٻڪ ايجاد ٿيل ۽ سفارش ڪيل جنسن حملونٿو ٿئي پر جيڪڏهن موسمي حالتن جي ڪري ڪئي حملونظر اچي ته جلد حد جي زرععي ماهر سان رابطو ڪجي ۽ جسنون صرف سند جون سفارش ڪيل پوکڻ گهرجن.

### ڪٻڪ جو لابارو ۽ ڳاهاه:

ڪٻڪ مان في ايڪڙ بهتر پيداوار حاصل ڪرڻ لاءِ لابارو ۽ ڳاهاه صحيح وقت تي ڪرڻ گهرجي. يعني ته اجا ڪٻڪ ٿوري ڪچي هجي ته لابارونه ڪجي ۽ پچي ويچن ڪان پوءِ لاباري ۾ دير نه ڪجي جيڪڏهن ڪجي ڪٻڪ جو لابارو ڪيو ويو ته داتا مارجي ويندا، وزن گهت ٿيندو ۽ پئي سال پوکڻ جي لائق نه رهندما ۽ پڻ مارڪيت ۾ اگهه به گهت ملنندو ۽ وري پچي ويچن ڪان پوءِ لاباري ۾ گھطي دير ڪئي وئي ته ڪٻڪ جا سنگ تئي پوندا ۽ سنگ ۾ موجود داتا چڻي ويندا، جنهن ڪري پيداوار گهتجي ويندي.

جڏهن مارچ ۽ اپريل مهينن ۾ جيئن ئي گرمي وڌندي آهي ته ڪٻڪ جو فصل به پچي

راس ٿيندو آهي. جڏهن ڪڪ جورنگ سائي مان ڦري پيلو يا سونهري ٿي وڃي تيلا ۽ سنگ سڪي وڃن ۽ مڙن لڳن. سنگ کي تريءَ تي رکي مهتجي ته آرام سان داڻا نكري اچن ۽ داڻا ڏندن جي زور تي تڪ ڪري پڃي پون ته سمجهججي ته ڪڪ جو فصل پچي راس ٿيو آهي. جڏهن 95 کان 98 سيكڙو سنگ پچي وڃن ته لاباري ۾ دير نه ڪجي. لاباري ۾ 10 کان 15 ڏينهن دير ڪرڻ سان ڪڪ 5 کان 10 سيكڙو چاڻو ڪري زيان ٿي وڃي ٿي. ان ڪري ايڏي نقصان کان بچڻ لاءِ وقت تي لابارو ڪرڻ تمام ضروري آهي.

لابارو هميشه صبح جو سوير يعني فجر جو شروع ڪجي ۽ منجهند کان اڳ ختم ڪجي، چو ته گرميءَ جو درجو وڌن ڪري سنگ نٿن ۽ داڻن چڻن جو انديشو هوندو آهي. لابارو زمين سان لائي ڪرڻ گهرجي ته جيئن بهه وڌيڪ حاصل ٿئي لاباري ڪرڻ وقت تڪڙ بلڪل نه ڪجي. چو ته تڪڙ ڪرڻ ڪري ڪڪ چطي زيان ٿيندي. ستريون هڪ مهاڙيون ٺاهجن ۽ ڪوشش ڪري گڏ ڪري ٻڌن ۽ سرن مان ٺهيل نوزين يا نئين پراٽي واط سان نندا نندا گڏا ٻڌي چڏجن. چو ته هن وقت تيز هوا، برسات ۽ ڳڙي وغيره جو خطر و هوندو آهي. پوءِ جيڪڏهن گڏا ٻڌل نه هوندا ته ول ٿيڙي پكڙي زيان ٿي ويندي. گڏن کي بن تن ڏينهن لاءِ پني ۾ رهڻ ڏجي ته جيئن ول چڱيءَ طرح سڪي وڃي ۽ ان ڳاهم جي مشين مان آسانی سان صاف ٿي نكري سگهي ۽ داڻا پڃي تني زيان نه ٿين. ڳاهم جو ڪم اس ۾ جڏهن ماڪ ختم ٿي وڃي ته پوءِ ڪرڻ گهرجي ۽ ٿريشور کي ڳاهم شروع ٿيڻ کان اڳ چڱيءَ طرح صاف ڪرڻ گهرجي ۽ ان ڳالهه جو خاص خيال رکجي ته ٿريشور کي جا ڪتر تيز هجن ته جيئن ڳاهم واري ڪم ۾ دير نه ٿئي. ڳاهم دوران ٿريشور جو وقت بوقت معائنو ڪبورهجي. تيز هوا هجي ته ٿريشور بند ڪرڻ گهرجي. عامر هوا جي حالت ۾ هوا جي طرف کان هوا جهل ڪجي.

## ذخیرو:

ڪڪ کي ذخيري وارن جيتن كان بچاء لاء آن ديري مان صاف پوريين هر ڀرجي ۽ گندين پلين کي صاف ڪجي. گهرن ۾ ندي سطح تي ڪڪ ذخiro ڪرڻ لاء ڪڪ کي چڱي، طرح اس ۾ سڪائي صاف گنديءا ۾ وجهي نم جا پن وجهي فاستاڪسن جون گوريون وجهي هوا بند ڪري ڪنهن ڪليل هودار ۽ ڇانوري واري جاءه تي رکڻ گهرجي. پر جي ڪڪ وڌي پئمانی تي ذخiro ڪرڻي هجي ته 2 ڪلو چن 2 ڪلو توتيو الڳ الڳ پلاستڪ جي ٿانو ۾ 24 ڪلاڪ ڳاري ڪپڙ ڇاڻ ڪري 50 لتر پاڻي، ۾ ملاتي گدام جي پتین، چت ۽ فرش تي پوچي ڪرڻ گهرجي. اهو عمل ڪڪ ذخiro ڪرڻ كان هڪ مهينو اڳ ڪرڻ گهرجي ۽ بعد ۾ فاستاڪسن جون گوريون وجهي گدام کي هوا بند ڪجي.



## وڌيڪ معلومات ۽ رابطى لاءِ **هدایت اللہ چڱو**

دائريڪٽر جنرل

زرعي توسيع سند

## **غلام مصطفیٰ نانگراج**

دائريڪٽر زرعي اطلاعات

زرعي توسيع سند

پتو

دائريڪٽوريٽ زرعي اطلاعات

زرعي توسيع سند،

بلاڪ-ايف شهbaz بلڊنگ حيدرآباد

فون

0229200108, 0229201276

Email:  
[dir.infoagriext@gmail.com](mailto:dir.infoagriext@gmail.com)

Dissemination of Agricultural Information among the farming community through demonstration plots & Farmers Field Days, Electronic and Print Media Phase-II